PAGE 2

Traitements spécifiques contre les puces, punaises de lit et les cafards :

Les puces et les punaises de lit :

Avant tout, ne pas oublier de traiter les animaux domestiques porteurs des insectes avec des produits vétérinaires. Les puces et les punaises de lit ont 4 phases de développement dans leur vie : œuf, larve, cocon et adulte. Les insecticides n'éliminent que les larves et les puces adultes. Les œufs et les cocons sont protégés et vont éclore après une période prolongée ou après la mort des larves et adultes.

Le fumigène Kapo va en conséquence éliminer la première génération de puce et de punaises de lit soit les larves et adultes. La deuxième génération peut revenir de quelques heures à 10 jours après le traitement.

Pour éliminer cette deuxième génération, il est conseillé de pulvériser les zones où se logent les œufs (tapis, rainures de parquet…) à la suite du traitement fumigène. Nous conseillons d'appliquer un aérosol foudroyant puces et larves Kapo ou un aérosol foudroyant punaises de lit Kapo.

Selon la gravité de l'infestation, il sera peut-être nécessaire de réitérer l'ensemble du traitement.

Les cafards :

Les cafards ont la particularité d'être très mobiles. Si l'invasion est généralisée dans un habitat collectif, il faut se rapprocher du syndic pour procéder à une désinsectisation globale et simultanée.

Le fumigène va éliminer les nymphes et les cafards adultes dans la zone traitée uniquement. Afin d'éviter le retour des insectes, nous conseillons dans un premier temps d'éliminer toutes les sources de nourriture puis d'appliquer l'aérosol cafards et blattes Kapo ou d'utiliser une seringue cafards et blattes Kapo pour les endroits inaccessibles. Ces produits sont à appliquer dans les zones de passage des insectes, en général les endroits sombres, chauds et humides (derrière un réfrigérateur, sous un évier…) et restent efficaces jusqu'à 3 mois.

zone colle

PAGE 3

zone colle

MODE D'EMPLOI GÉNÉRAL CONTRE LES INSECTES RAMPANTS ET VOLANTS.

Arrêter la ventilation, fermer toutes les fenêtres et les portes délimitant le volume global à traiter. Mettre hors service les détecteurs de fumée le temps du traitement et prévenir les voisins.

Déposer au sol, au centre de la pièce à traiter, un support résistant à la chaleur (brique, cendrier, céramique…). Le fumigène doit être situé à plus de 50 cm de tout matériau combustible ou inflammable (rideaux, tissus, journaux…).

Ouvrir le bouchon en plastique, agiter la boîte de gauche à droite et retirer le capuchon qui protège la mèche. Placer le fumigène sur le support résistant à la chaleur, allumer la mèche et quitter la pièce en signalant aux accès la fumigation en cours. La fumée va se propager pendant quelques minutes.

Maintenir le local traité fermé pendant 6h et ne pas revenir pendant cette période.

Après le traitement, ventiler la pièce traitée pendant 2h avant de la réintégrer.

Passer soigneusement l'aspirateur et laver toutes les surfaces.